




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนาหมื่น	
ชื่อกลุ่มงาน : เกสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	
วัน/เดือน/ปี : 2 มิถุนายน 2566	
หัวข้อ : ขออนุญาตขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางโรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http:// www.namuenhospital.go.th	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
1. แบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (Drug Use Evaluation; DUE)	
2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง	
Link ภายนอก :	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวปิยาภรณ์ สอนใจ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ วันที่ 2 มิถุนายน 2566	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสาวธัญญา บุญอิน) ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ วันที่ 2 มิถุนายน 2566
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวศิรินา ติสระ) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ วันที่ 2 มิถุนายน 2566	

1.แบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (Drug Use Evaluation; DUE)

โรงพยาบาลนาหมื่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ยา Atorvastatin 40 mg (บัญชชี ง)

1. ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อ-สกุล.....HN.....AN.....อายุ.....ปี

สิทธิการรักษา.....

Diagnosis/Underlying disease.....

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ LDL.....mg/dl (วันที่.....)

2. ข้อมูลประกอบการอนุมัติและข้อมูลการใช้ยา

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องเหตุผลประกอบการใช้ยา (อย่างน้อย 1 ข้อ)

ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยา simvastatin ในขนาด 40 mg ติดต่อกัน 6 เดือน แล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับ LDL-C ได้ถึงค่าเป้าหมาย

ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ simvastatin ได้กล่าวคือมีผลข้างเคียง ได้แก่ มีค่า alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มขึ้น 3 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ (upper limit of normal) หรือค่า Creatinine phosphokinase (CPK) เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ

ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับยา lopinavir + ritonavir โดยให้ใช้ยา atorvastatin ในขนาดต่ำสุดเท่าที่จำเป็น

อื่นๆ ระบุ.....

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. หลีกเลี่ยงการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับ cyclosporine, HIV protease inhibitor (tipranavir + ritonavir), hepatitis C protease inhibitor (telaprevir)

2. หลีกเลี่ยงการใช้ยา atorvastatin

2.1 ในขนาดเกินวันละ 40 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา nelfinavir

2.2 ในขนาดเกินวันละ 20 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา clarithromycin, itraconazole, HIV protease inhibitor (saquinavir + ritonavir, darunavir + ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir + ritonavir)

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง นายแพทย์.....

2.แนวทางการจ่ายยา Spiriva Handihaler (Tiotropium bromide 18 mcg)

<p>1.Spirometry confirmed diagnosis</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ผล spirometry : post bronchodilator < 0.7 วันที่ Dx..... 	<p>5.การประเมินความร่วมมือในการใช้ยา(ก่อนได้รับ Spiriva)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>2.การประเมินข้อบ่งชี้ของการได้รับ inhale corticosteroid(ICS) กรณีต้องการเพิ่มหรือหยุดยา ICS</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ระดับ Blood Eosinophil ขณะ stable (ผู้ป่วยต้องไม่มีการกำเริบอย่างน้อย 1 เดือน) <p>EOS =cells/μL วันที่ตรวจ.....</p>	<p>6.การประเมินความร่วมมือในการใช้ยา(หลังได้รับ Spiriva)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>3.Current Medications</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>4.....</p> <p>5.....</p> <p>6.....</p> <p>7.....</p>	<p>7.ความเห็นแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ สมควรได้รับยา เนื่องจาก..... ○ ไม่สมควรได้รับยา เนื่องจาก..... <p>ลงชื่อ.....แพทย์</p>
<p>4.การประเมินอาการเหนื่อย และการกำเริบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CAT score =..... ○ mMRC =..... 	<p>8.ความเห็นเภสัชกร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ สมควรได้รับยา เนื่องจาก..... ○ ไม่สมควรได้รับยา เนื่องจาก..... <p>ลงชื่อ.....เภสัชกร</p>

สรุปผลการประเมินการใช้ยา Atorvastatin 40 mg รพ.นาหมื่น

ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 มกราคม 2566 – 30 พฤษภาคม 2566

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา atorvastatin 40 mg ใหม่ คือ 8 ราย

สาเหตุที่พิจารณาให้ยาเกิดจาก

1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยา simvastatin ในขนาด 40 mg ติดต่อกัน 6 เดือน แล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับ LDL-C ได้ถึงค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50
2. Muscle strain จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ยาร้อยละ 87.50

สรุปผลการประเมินการใช้ยา Tiotropium bromide 18 mcg รพ.นาหมื่น

ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤษภาคม 2566

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา Tiotropium bromide 18 mcg ใหม่ คือ 9 ราย

สาเหตุที่พิจารณาให้ยาเกิดจาก ผู้ป่วย COPD Group D

แนวทางเพิ่มเติม ผ่านการพิจารณาการใช้ยาโดยแพทย์ และประเมินความสามารถในการใช้ยาโดยเภสัชกรว่าสามารถใช้ได้

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ยาร้อยละ 100

ผู้ให้ข้อมูล



(นางสาวธัญญา บุญอิน)

เภสัชกรชำนาญการ